

SINOPOL®

30 | COMPRIMIDOS
FAST-SLOW



INFORMACIÓN

Sinopol® es un complemento alimenticio a base de Mioinositol, Ácido α -Lipoico, Ácido Fólico, Betaína, Vitamina B₂, Vitamina B₆ y Vitamina B₁₂, indicado para cubrir los requerimientos nutricionales en la mujer en aquellas situaciones en que sea necesario complementar la dieta normal.

Sinopol® es útil en estados carenciales de:

- ▶ **Mioinositol:** componente natural que pertenece al complejo vitamínico B. Está presente en muchos alimentos como los cereales, las nueces y la fruta. El mioinositol forma parte de la familia de los inositoles, los cuales intervienen en procesos fisiológicos como el metabolismo de la glucosa. Está presente en concentraciones importantes en los órganos reproductores.
- ▶ **Ácido α -lipoico:** conocido por sus propiedades antioxidantes y como coenzima en el metabolismo celular, donde interviene en importantes ciclos metabólicos como la producción de energía en las células.
- ▶ **Ácido fólico:** vitamina del grupo B (vitamina B₉). Se encuentra en el hígado, los frutos secos y los cereales. Tiene un papel esencial en la división celular, en el crecimiento de los tejidos maternos en el embarazo y en el metabolismo de la homocisteína. Los altos niveles de homocisteína pueden observarse a menudo en personas con infertilidad. Una ingesta suplementaria de ácido fólico incrementa el nivel de folato materno, el cual ayuda a prevenir defectos del tubo neural en el feto en desarrollo. El efecto beneficioso se obtiene con una ingesta diaria de 400 μ g durante al menos un mes antes de la concepción y hasta tres meses de embarazo.
- ▶ **Betaína:** sustancia natural necesaria para el metabolismo de la homocisteína.
- ▶ **Vitamina B₂:** contribuye al metabolismo energético normal, al funcionamiento normal del sistema nervioso, a la protección de las células frente al daño oxidativo y al mantenimiento de la piel en condiciones normales.
- ▶ **Vitamina B₆:** ayuda en la regulación de la actividad hormonal y al metabolismo normal de la homocisteína, de las proteínas y del glucógeno.
- ▶ **Vitamina B₁₂:** contribuye al metabolismo energético normal, al metabolismo normal de la homocisteína y al proceso de división celular.

MODO DE EMPLEO

Tomar **2 comprimidos** al día separado de las comidas, con un intervalo de al menos 10 horas entre las dos tomas.

La exclusiva técnica de fabricación Fast-Slow garantiza la liberación prolongada en el tiempo de los nutrientes que contiene consiguiendo una concentración constante a lo largo del día y así mejorando su efecto.

ADVERTENCIAS

Los complementos alimenticios no deben utilizarse como sustitutos de una dieta variada y equilibrada y de un modo de vida sano. No sobrepasar la cantidad diaria recomendada. Conservar en lugar fresco y seco, protegido de la luz solar. Mantener fuera del alcance de los niños más pequeños.

Si está en tratamiento con fármacos hipoglucemiantes, antes de la toma del producto consulte con su médico. En casos raros el ácido lipoico puede dar hipoglucemia.

ALÉRGENOS

Los productos Uriach, salvo que se indique explícitamente en el envase, no contienen ninguno de los alérgenos que deben indicarse en la etiqueta, de acuerdo con el Anexo 2 del REG. (UE) No. 1169/2011 (y modificaciones posteriores).



SIN GLUTEN

Sinopol® lo pueden tomar personas con intolerancia o sensibilidad al gluten.



SIN LACTOSA

Sinopol® lo pueden tomar personas con intolerancia o sensibilidad a la lactosa.



01ITLF263174/2307